

RODONTICIDE

SOURAPIDE PÂTE

PÂTE RODONTICIDE BRODIFACOUM
AMM N° FR-2014-0142



- ✓ **PRATICITÉ** : Appât en pâte, prêt à l'emploi.
- ✓ **FIABILITÉ** : Efficacité prouvée dans les milieux les plus difficiles.
- ✓ **SOLUTION** : Conseillé en cas de résistance aux autres coagulants.
- ✓ **ATTRACTIVITÉ** : Très attractif et puissant.

UTILISATION :

- › Le Brodifacoum est un anticoagulant de deuxième génération.
- › Les rongeurs meurent d'hémorragies internes quelque jour après ingestion de l'appât.
- › Bien qu'à la concentration de 40ppm un seul repas suffise à tuer les rats et souris, l'effet retard permet de contourner leur méfiance.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **Type de produit** : TP14- Rodenticide
- › **Substance active** : Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)
- › **Concentration** : 0,004% m/m
- › **Amérisant** : Benzoate de denatonium 10ppm
- › **Nom homologué** : SAPHIR PASTA
- › **N° d'AMM** : FR-2014-0142 Professionnels de la lutte contre les rongeurs.
- › **Organismes ciblés** : Rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*), Souris domestiques (*Mus musculus*).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Utilisation à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles contre Les rats et Les souris domestiques. L'utilisation dans les décharges, les déchetteries et aux abords des infrastructures est autorisée pour les professionnels de la lutte contre les rongeurs uniquement. Consulter la FDS pour plus d'informations.

MODE D'EMPLOI :



Le produit ne doit être utilisé que dans des postes d'appâtage. Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation.



Adapter le nombre de sachets préconisés par poste d'appâtage à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d'application du produit :

- Contre les rats : 60g de produit par poste d'appâtage espacés de 5 à 10 mètres.
- Contre les souris: 10g de produit par poste d'appâtage espacés de 3 à 5 mètres.



Inspecter et réapprovisionner les postes d'appâtage durant la période de traitement, trois jours après application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.



Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.



Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale.



Protéger les appâts de façon à épargner la faune non ciblée, notamment les chats et les chiens et de façon à ce que le public ne puisse pas y avoir accès.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT

Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net